

Информация о реализации предписанных Роспотребнадзором дезинфекционных мероприятиях  
в МБУ СШОР № 9 «Академия футбола»

№ п/п	Используемое средство	Состав	Возможное влияние на человека/ побочные эффекты	Влияние на окружающую среду	Эффективность по отношению к вирусам
1	Лижен – ИП (кожный антисептик)	Изопропиловый спирт (пропанол-2) 63 %, Клатрат дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной 0.1 %, Компоненты, улучшающие состояние кожи, Хлоргексидина биглюконат 0.5 %	Класс опасности: при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4	Не обнаружено	Бактерии - <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , <i>Грамотрицательные бактерии</i> , <i>Грамположительные бактерии</i> ; Вирусы - ВИЧ, <i>Гепатита В</i> ; Патогенные грибы - <i>Дерматофитон</i> , <i>Кандида</i> ;
2	Лижен – ИП (для обработки поверхностей)	Изопропиловый спирт (пропанол-2) 63 %, Клатрат дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной 0.1 %, Компоненты, улучшающие состояние кожи, Хлоргексидина биглюконат 0.5 %	Класс опасности: при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4	Не обнаружено	Бактерии - <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , <i>Грамотрицательные бактерии</i> , <i>Грамположительные бактерии</i> ; Вирусы - ВИЧ, <i>Гепатита В</i> ; Патогенные грибы - <i>Дерматофитон</i> , <i>Кандида</i> ;
3	А – ДЕЗ (дезинфицирующее средство с моющим эффектом)	Спирт изопропиловый - 60,0%, 2-феноксиэтанол- 0,1%, а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, в том числе Д-пантенол.	При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 1-2 капли 30% раствор сульфацила	не допускать попадания средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию	Бактериальные (включая туберкулез – <i>M.terrae</i> ), вирусные, кандидозы, дерматофитии

			<p>натрия. 4.2. При появлении на коже раздражения, сыпи – прекратить применение средства, руки вымыть водой с мылом. 14 4.3. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение, а помещение проветрить. Дать теплое питье. Рот и носоглотку прополоскать водой. 4.4. При попадании средства в желудок промыть желудок большим количеством воды, вызвать рвоту. Затем принять активированный уголь (10-12 измельченных таблеток). 4.5. При необходимости обратиться к врачу.</p>		
--	--	--	--	--	--